



# Bollettino settimanale del CENTRO OPERATIVO PER LA LOTTA ALLE ZANZARE

BIELLESE ED ALTO VERCELLESE

R.T.S. dott. Bruciaferri Davide tel. 348/3018155 e-mail: [zanzare.biellese@gmail.com](mailto:zanzare.biellese@gmail.com)

Periodo di riferimento: 01-07 agosto 2022

## Livelli medi di infestazione dei focolai di sviluppo larvale

	Nulla/molto basso (0-5 larve/½ l)	Basso (da 5 a 10 larve/½ l)	Medio (da 10 a 20 larve/½ l)	Elevato (da 20 a 50 larve/½ l)	Molto elevato (>50 larve/½ l)
Caditoie			✓	✓	
Focolai naturali			✓	✓	

## Trattamenti larvicidi biologici effettuati nei Comuni

Comune	Adulticidi (Prodotto utilizzato: piretroidi)	Repellente (Prodotto utilizzato: Z-Stop a base estratti d'aglio)	Larvicidi Biologici Codici focolai trattati (Prodotto utilizzato <i>Bacillus Thuringiensis</i> var. <i>israelensis</i> )
AZEGLIO			1A003AZ, 1A011AZ, 1A012AZ
BRUSNENGO			4A002BU, 4A013BU
COSSATO	✓ 01/08 Piazza CRI		
GRAGLIA		✓ 03/08 (Fraz. Pranco)	
GATTINARA			3B002GT, 3B035GT, 3B038GT
LENTA			4A005LE, 4A016LE, 4A030LE, 4A033LE
LOZZOLO	✓ 03/08 Cole Mazzucco (sede alpini)		3B017LO, 3B018LO, 3B019LO, 3B020LO
MEZZANA MORTIGLIENGO			3A007ME, 3A008ME
PIVERONE	✓ 03/08 (centro paese)		1A001PV, 1A004PV
ROASIO			3B004RO, 3B005RO, 3B014RO
SORDEVOLO	✓ 03/08 (Anfiteatro Passione)		
STRONA			3A010ST, 3A011ST
VILLA DEL BOSCO	✓ 03/08 Centro paese		
VIGLIANO B.SE			2009VI, 2010VI, 2011VI, 2016VI, 2017VI, 2018VI
VIVERONE			1A001VV, 1A002VV


## Trattamento tombini pubblici (prodotto utilizzato: Diflubenzuron/B.t.i.+ B.s.)

### Comuni sottoposti a trattamento:

Candelo, Curino, Lessona, Roasio, Soprana, Trivero, Vallemosso, Viverone, Zimone

## Andamento delle catture e previsioni sull'andamento dei livelli di molestia

Al 3 agosto le catture degli adulti di zanzara nel nostro comprensorio, segnano un evidente decremento (vedasi grafico seguente), arrivando a livelli addirittura inferiori a quelli della prima settimana di cattura (8/6); in due stazioni di monitoraggio (Occhieppo Sup. e Muzzano), il dato si è addirittura azzerato. Solamente nei casi delle Stazioni di Azeglio e di Gattinara si sono avute catture degne di nota, con valori rispettivamente di 180 e 447 esemplari, prevalentemente appartenenti al genere *Oc. Caspius*.



Nel grafico sottostante si può vedere come la specie di risaia (*Oc. caspius*) finora abbia prevalso nettamente sulle altre, con valori oltre al 90%.

