



Bollettino settimanale del CENTRO OPERATIVO PER LA LOTTA ALLE ZANZARE

BIELLESE ED ALTO VERCELLESE

R.T.S. dott. Bruciaferri Davide tel. 348/3018155 e-mail: zanzare.biellese@gmail.com

Periodo di riferimento: 08-14 agosto 2022

Livelli medi di infestazione dei focolai di sviluppo larvale

	Nulla/molto basso (0-5 larve/½ l)	Basso (da 5 a 10 larve/½ l)	Medio (da 10 a 20 larve/½ l)	Elevato (da 20 a 50 larve/½ l)	Molto elevato (>50 larve/½ l)
Caditoie		✓	✓	✓	
Focolai naturali		✓	✓	✓	

Trattamenti larvicidi biologici effettuati nei Comuni

Comune	Adulticidi (Prodotto utilizzato: piretroidi)	Repellente (Prodotto utilizzato: Z-Stop a base estratti d'aglio)	Larvicidi Biologici Codici focolai trattati (Prodotto utilizzato <i>Bacillus Thuringiensis</i> var. <i>israelensis</i>)
AZEGLIO			1A001AZ, 1A003AZ
BORGOSIESIA		✓ 10/08 (Centro città)	3B001BG; 3B002BG; 3B003BG, 3B004BG, 3B005BG, 3B020BG, 3B021BG, 3B023BG
BRUSNENGO			4A013BU
CASTELLETTO CERVO			4A007CC, 4A009CC, 4A011CC, 4A023CC, 4A024CC
CAVAGLIA'	✓ 10/08 (centro Polivalente)		4B043CV, 4B054CV
COSSATO		✓ 10/08 Piazza CRI	
GATTINARA			3B002GT, 3B021GT, 3B024GT, 3B030GT, 3B031GT, 3B034GT, 3B045GT, 3B051GT, 3B052GT, 3B053GT, 3B054GT, 3B056GT, 3B057GT
LENTA			4A005LE, 4A008LE, 4A020LE
LOZZOLO			3B017LO
PIVERONE			1A004PV, 1A005PV, 1A006PV, 1A010PV, 1A011PV
ROASIO			3B010RO
ROPPOLO			1A001RP, 1A005RP
ROVASENDA			4A001RV, 4A002RV, 4A003RV, 4A005RV, 4A006RV, 4A007RV, 4A008RV
STRONA			3A010ST, 3A011ST
VILLA DEL BOSCO	✓ 10/08 Centro paese		
VIVERONE			1A005VV

Trattamento tombini pubblici (prodotto utilizzato: Diflubenzuron/B.t.i.+ B.s.)


Comuni sottoposti a trattamento:

Pray, Villanova B.se.

Andamento delle catture e previsioni sull'andamento dei livelli di molestia

Gli ultimi dati del monitoraggio della zanzara tigre, mostrano una tendenza generale ad una riduzione della consistenza delle popolazioni della specie. Sono tuttavia in leggero aumento i casi di positività delle trappole dato che testimonia l'estendersi del territorio colonizzato da questa zanzara. Ciò che non varia sono i casi critici, quelli con un numero di uova catturate ben al di sopra della media ed oltre le 150 catture.

Questi dati suggeriscono di non abbassare il livello di attenzione nei confronti della specie che, in vista di un periodo più piovoso di fine estate, potrebbe far osservare dei nuovi picchi di presenza.



Nonostante il calo delle popolazioni di zanzara su tutto il territorio, si ribadisce la necessità di gestire in maniera corretta i ristagni in ambito domestico e soprattutto ortivo, dove la proliferazione di zanzara comune potrebbe aumentare il rischio potenziale all'esposizione al West Nile Virus, i cui casi umani sono ancora in crescita nella nostra Regione.