



Bollettino

del CENTRO OPERATIVO PER LA LOTTA ALLE ZANZARE

BIELLESE ED ALTO VERCELLESE

R.T.S. dott. Bruciaferri Davide tel. 348/3018155 e-mail: zanzare.biellese@gmail.com

Periodo di riferimento: 29 agosto – 11 settembre 2022

Livelli medi di infestazione dei focolai di sviluppo larvale

	Nulla/molto basso (0-5 larve/½ l)	Basso (da 5 a 10 larve/½ l)	Medio (da 10 a 20 larve/½ l)	Elevato (da 20 a 50 larve/½ l)	Molto elevato (>50 larve/½ l)
Caditoie		✓	✓		
Focolai naturali		✓	✓		

Trattamenti larvicidi biologici effettuati nei Comuni

Comune	Adulticidi (Prodotto utilizzato: piretroidi)	Repellente (Prodotto utilizzato: Z-Stop a base estratti d'aglio)	Larvicidi Biologici Codici focolai trattati (Prodotto utilizzato <i>Bacillus Thuringiensis</i> var. <i>israelensis</i>)
BORGOSIESIA			3B016BG, 3B016BGb, 3B024BG, 3B032BG
GATTINARA		✓ 8/09 Festa dell'UVA	3B038GT
LESSONA			3A017LS
MEZZANA MORTIGLIENGO			3A007ME, 3A008ME
STRONA			3A010ST, 3A011ST

Trattamento tombini pubblici (prodotto utilizzato: Diflubenzuron/B.t.i.+ B.s.)

Comuni sottoposti a trattamento:


Borgosesia, Cavaglià, Coggiola, Gattinara, Graglia, Lessona, Lozzolo, Massazza, Mongrando, Netro, Occhieppo superiore, Piverone, Quaregna, Roppolo, Sordevolo, Strona, Villanova Biellese.

Andamento delle catture e previsioni sull'andamento dei livelli di molestia

Monitoraggio adulti

Nell'ultima data di monitoraggio si è assistito ad un drastico calo delle catture (vedasi grafico alla pagina successiva), che in diversi casi sono state pari a zero (Verrone, Zimone, Cavaglià e Occhieppo Sup.).

Le stazioni di monitoraggio di Rovasenda e Gattinara sono le uniche ad aver catturata ancora un numero significativo di *Ochlerotatus caspius* (z. di risaia), confermando la loro forte esposizione a questa particolare specie. In quasi tutti i casi sono presenti catture di zanzara tigre, fatto che dimostra la piena diffusione di questa specie (che peraltro più difficilmente viene catturata dalle trappole a CO₂).



Monitoraggio zanzara tigre

La grande diffusione della zanzara tigre è confermata anche dai dati del monitoraggio specifico con ovitrappole (vedasi anche grafico successivo); nell'ultima data infatti si sono raggiunti i più alti livelli medi di cattura della stagione nonché di casi critici.

La molestia avvertita sul territorio rimane piuttosto alta e ancora attribuibile alla zanzara tigre che, nelle ultime settimane, è stata agevolata dalle piogge nella sua proliferazione.

Fra i siti con maggior concentrazione di focolai si segnalano i cimiteri dove si creano numerosissimi ristagni d'acqua in corrispondenza delle ampole porta-fiori. Per questo si ricorda a tutta la popolazione l'importanza di riempire fino all'orlo con materiale inerte detti contenitori. Si rinnova altresì l'invito alle Amministrazioni comunali di collocare presso gli ingressi dei cimiteri appositi contenitori di sabbia affinché i fruitori siano incentivati ed agevolati in tale semplice operazione.

